

**HOJA INFORMATIVA RELATIVA A LA
VACUNACIÓN DE COVID-19 CON ASTRAZENECA**

 Fecha:
31/03/2021
 Sustituye a:
23/03/2021

CUESTIONARIO	MEDIDAS A ADOPTAR
¿Ha padecido reacción alérgica grave o inmediata a dosis previas de esta vacuna o a alguno de sus componentes como polisorbato y polietilenglicol?	Contraindicación absoluta.
¿Ha pasado la COVID19, con o sin síntomas, en los últimos 6 meses?	Posponer la vacunación.
¿Padece alguna enfermedad aguda moderada-grave o fiebre >38°C?	Posponer la vacunación.
¿Padece mastocitosis?	Posponer la vacunación.
¿Tiene antecedentes de reacción alérgica a otras vacunas o tratamientos inyectables?	Observar 30 minutos tras la vacunación.
¿Ha recibido alguna vacuna en los últimos 7 días? (no se incluyen vacunas para alergias)	Posponer la vacunación. Se recomienda separar la vacuna frente a COVID-19 de otras vacunas previas un mínimo de 14 días.
¿Padece inmunosupresión?	Vacunar igualmente. La respuesta inmune puede ser inferior.
¿Padece alguna de estas enfermedades?: -Trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido y lista de espera para trasplante de órgano sólido. -Tratamiento sustitutivo renal (hemodiálisis y diálisis peritoneal). -Enfermedad oncohematológica: cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, metastásico o con radioterapia por tumores de localización torácica con riesgo de pneumonitis. -Inmunodeficiencias primarias, infección con el VIH con menos de 200cél/ml a pesar de TAR eficaz y carga viral indetectable. -Síndrome de Down con 40 y más años de edad.	Posponer por condición de riesgo. Estas personas serán vacunadas con otro tipo de vacuna y se les citará específicamente
¿Está recibiendo tratamientos frente a COVID19 (plasma de convalecientes, anticuerpos monoclonales o antivíricos)?	Posponer la vacunación 90 días.
¿Está recibiendo tratamiento crónico con anticoagulantes?	Precisa valoración: Si INR descontrolado, posponer la vacunación. Si INR controlado y estable pueden recibir la vacunación IM. Presionar 2 minutos tras la administración. Se recomienda utilizar la técnica en Z para la inyección.
¿Está embarazada? ¿Tiene pensado quedarse embarazada? ¿Está lactando?	Posponer la vacunación. Se recomienda esperar a quedarse embarazada dos semanas después de la segunda dosis. Vacunar y continuar con lactancia.
¿Qué edad tiene?	Fijarse en la edad mínima y máxima recomendada (en población general, personas nacidas entre 1956 y 2003).